Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
*Növényvédelmi Igazgatóság*

*1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.*
*Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 30.*
*Telefon: +36 (30) 216-6303*
*ni@nebih.gov.hu*
*portal.nebih.gov.hu*

*Ikt. sz.:* **8750/93786-2/2026**
*Tárgy:* **Pledge 50 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
*Ügyintéző:* Piróth-Kisfaludy Dóra
*Elérhetőségek:* ni@nebih.gov.hu
*Oldalak száma: 3*
*Mellékletek:* Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Sumitomo Chemical Agro Europe SAS** (10A Rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Franciaország) ügyfél kérelmére a **Pledge 50 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Pledge 50 WP gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **8750/37731-1/2026 Nébih** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

**m ó d o s í t j a:**

*I. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

***7. Eltarthatósági idő:*** Fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 350.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2026. november 9.

**dr. Nemes Imre Zoltán**
elnök
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél/Ügyfél meghatalmazottja
2. Irattár

(711/2026)

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**
Növényvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
☎ +36 (30) 216-6303
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

# FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

***1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:***

| | |
|---|---|
| ***1.1. Engedélyokirat száma:*** | **8750/37731-1/2026 Nébih** |
| ***1.2. Növényvédő szer neve:*** | **Pledge 50 WP** |
| ***1.3. Engedélyokirat érvényessége:*** | **2038. február 28.** |
| ***1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:*** | **Sumitomo Chemical Agro Europe SAS**<br>10A Rue de la Voie Lactée<br>69370 Saint Didier au Mont d'Or,<br>Franciaország |
| ***1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:*** | - |

***2. A növényvédő szer adatai:***

| | |
|---|---|
| ***2.1. Növényvédő szer gyártója:*** | **Sumitomo Chemical Agro Europe SAS**<br>10A Rue de la Voie Lactée<br>69370 Saint Didier au Mont d'Or,<br>Franciaország |
| ***2.2. Növényvédő szer rendeltetése:*** | **gyomirtószer** |
| ***2.3. Növényvédő szer formulációja:*** | nedvesíthető por **(WP)** |

***2.4. Növényvédő szer összetétele**:*

*2.4.1. hatóanyag*

*ISO név* **flumioxazin**

*CAS szám* *103361-09-7*

*IUPAC név* *N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciklohex-1-én-1,2-dikarboximid*

*tiszta hatóanyag részaránya* **500 g/kg**

***3. Minőségi követelmények:***

*3.1. Hatóanyag tartalom*

*3.1.1.* **flumioxazin** (HPLC/UV) 50,0 % (m/m) ± 2,5% (m/m)

*3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:* Meg kell felelnie a **„WP”** formuláció FAO követelményeinek.

*Tájékoztató jellegű adatok:*

**Megjelenés:** bézs színű por
**pH (1%-os hígítás, 21°C):** 6,7
**Térfogatsűrűség (ömlesztett):** 0,39 g/ml
**Tartós habképződés (0,1%-os hígítás, 1 perc):** 28 ml
**Nedves szita maradék (75 µm):** 0,031 %

***4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:***

| **Kultúra** | **Károsító** | **Kezelések évenkénti <u>maximális</u> száma** | **Két kezelés közt eltelt minimális időtartam** *(nap)* | **Dózis** *(g/ha)* | **Vízmennyiség** *(l/ha)* | **Kezelés ideje** (*fenológiai állapot szerint)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **kukorica (szemes, siló)** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 80 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-05) |
| **napraforgó** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 80 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-07) vagy 2-4 leveles fejlettségnél (BBCH 12-14) |
| **szója** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 80 | 200-300 | vetés előtt a talajba dolgozva (PPI), vagy preemergensen (BBCH 00-07) |
| **burgonya** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 80-100 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-08) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **cirok** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 80 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-07) |
| **szőlő (3 évesnél idősebb telepítés)** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 200-300 | 200-300 | rügyfakadás kezdete előtt (BBCH 00-05), gyomnövények kelése előtt |
| **csonthéjasok (3 évesnél idősebb telepítés)** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 200 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt |
| **almatermésűek (3 évesnél idősebb telepítés)** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 200-300 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt |
| **erdészet (tűlevelűek, lombos erdő)** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 300-600 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt |
| **őszi búza** | magról kelő kétszikű gyomnövények, *Apera spica-venti* | 1 | - | 60 | 200-300 | 1 leveles állapottól bokrosodás kezdetéig (BBCH 11-21) |
| **díszfaiskola (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) 1 évesnél idősebb** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 100-200 | 250-300 | gyomnövények kelése előtt és a gyomok 2-6 leveles fejlettségénél alkalmazva |

| **Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kultúra** | **Károsító** | **Kezelések évenkénti <u>maximális</u> száma** | **Két kezelés közt eltelt minimális időtartam** *(nap)* | **Dózis** *(g/ha)* | **Vízmennyiség** *(l/ha)* | **Kezelés ideje** *(fenológiai állapot szerint)* |
| **olajtök** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 50-60 | 200-400 | vetés után, kelés előtti kezelés (BBCH 00–07) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **sárgarépa** | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 50-60 | 200-400 | posztemergensen, a kultúrnövény 3-4 leveles állapotában (BBCH 13-14) |

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**Kukoricában** (szemes, siló) a készítményt a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni.

**Napraforgóban** vetés után kelés előtt (preemergensen), és állománykezelés formájában is kijuttatható a készítmény. Állománykezelés esetén a kijuttatást a napraforgó, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korában kell elvégezni. *Szikleveles napraforgót kezelni tilos, a javasoltnál fejlettebb állományban a kezelést követően a napraforgó levelein perzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek!*

**Szójában** a kezelést vetés előtt, 6-8 cm mélyen a talajba dolgozva (PPI) kell elvégezni, vagy vetés után kelés előtt (preemergensen) kell kipermetezni a készítményt, a vetést követő két napon belül.

**Burgonyában** ültetés után kelés előtt (preemergensen) a végleges bakhátakra kell kipermetezni a készítményt. *A burgonya kelésekor lehulló nagyobb mennyiségű csapadék esetén a készítmény a kelő egyedeken perzselésben megnyilvánuló, múló fitotoxikus tüneteket okozhat.*

**Cirokban** a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell a készítményt kijuttatni.

**Szőlőben** (bor, csemege), **csonthéjasokban** (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló) és **almaterméűekben** (alma, körte, birs, naspolya) 3 évesnél idősebb telepítésekben alkalmazható. A kezelések kora tavasszal (preemergensen) növényi maradványoktól mentes jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre végezhetők el. Szőlőben a készítményt a rügyfakadás előtt kell kijuttatni. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület 50%-a kezelhető!

**Erdészeti kultúrákban** (tűlevelűek, lombos erdő) a telepítés évében ill. évétől alkalmazható kora tavasszal rügypattanás előtt preemergens kijuttatással. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület 50%-a kezelhető!

**Őszi búzában** a készítményt ősszel korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától, vagy tavasszal az őszi búza bokrosodásának kezdetéig kell kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban, a nagy széltippan (*Apera spica-venti*) 1-3 leveles korában a legérzékenyebb a készítményre.

**Díszfaiskolában** (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus fajok esetén), 1 évesnél idősebb állományban alkalmazható kora tavasszal a kultúrnövény fakadása előtt, gyomnövények szempontjából preemergens vagy posztemergens kijuttatással. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni, posztemergens kezelésnél a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-6 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület 50%-a kezelhető!

A készítmény kizárólag a magról kelő kétszikű gyomfajok, valamint a nagy széltippan ellen hatékony, egyéb egyszikű gyomnövények, valamint évelő kétszikűek ellen az adott kultúrában ezek ellen engedélyezett egyéb gyomirtó készítmények alkalmazása szükséges.

***Kiskultúrás felhasználások a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009/EK rendelet 51. cikk alapján:***

A készítmény **olajtök** kultúrában preemergensen, vetés után kelés előtt 50-60 g/ha dózisban, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen használható fel.
Az optimális hatás érdekében a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. *A kezelést követően talajmunkát ne végezzünk!*
A készítmény 50-60 g/ha dózisban a következő magról kelő kétszikű gyomnövény ellen jó hatékonyságú: szőrös disznóparéj (*Amaranthus retroflexus*).
Mérsékelten érzékeny gyomfajok: fehér libatop (*Chenopodium album*), csattanó maszlag (*Datura stramonium*), ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*).
Felhasználása során más növényvédő szerekkel, kiváltképp gyomirtó szerekkel való kijuttatása gyártói tapasztalatok alapján kimondottan ellenjavallott!
*A Pledge 50 WP-vel történő olajtök kezelést követően a kezelt állomány sérülhet, pusztulhat, ha az alábbi feltételek egyike, vagy ezek bármely kombinációja bekövetkezik a valódi lomblevelek megjelenéséig a csírázás periódusában:*
*- rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadék*
*- folyamatos, csapó esőzés*
*- lefolyástalan területeken megálló huzamosabb vízborítás*
*- összefolyó csurgalékvízzel, vagy iszaptakarással bekövetkező túldozírozással.*

A készítmény **sárgarépa** kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 3-4 leveles állapotában 50-60 g/ha dózisban, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen használható fel.
*A megfelelő szelektivitás érdekében csak az ép levelű növényállományt szabad kezelni! Nedves növényállományt nem szabad a készítménnyel kezelni, mert erős károsodást okozhat! Csapadékos időjárás, öntözés esetén a kijuttatást 2-3 csapadékmentes és öntözéstől mentes napot követően szabad elvégezni! A kezelést követően rövid időn belül lehulló csapadék növelheti a kultúrnövény károsodását. Magas hőmérsékletkor, erős napsugárzás esetén a levélperzselés elkerülése céljából a permetezést az esti órákban kell elvégezni.*

***Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.***
***A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat kitöltésével (Adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási információkról) adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) kultúránként legalább 1 területről.***

Hatásmechanizmus:
*A flumioxazin hatóanyag a HRAC 14 (HRAC E), protoporfirinogén-oxidáz gátló herbicidcsoporton belül a N-fenil-imidek hatóanyagcsoportba tartozik.*

**Az emberi egészség védelme érdekében a készítmény kijuttatása kézi- és háti permetezőgéppel nem engedélyezett!**

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

***5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:***

***5.1. Veszélyességi besorolás:***

***5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:***

| | |
|---|---|
| **A készítmény p.o. $LD_{50}$ értéke (patkányon):** | **>2000 mg/ttkg** |
| **Vízi szervezetekre való veszélyesség:** | **kifejezetten veszélyes** |
| **Méhveszélyesség:** | **nem jelölésköteles** |
| *Méhveszélyesség toxicitás alapján*:* | *mérsékelten veszélyes* |
| *Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:* | *nem jelölésköteles* |
| **Tűzveszélyességi besorolás:** | **nem jelölésköteles** |

***5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:***

**GHS piktogram:**





**Figyelmeztetés:** **Figyelem**

***Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:***

| | |
|---|---|
| **H361d** | Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. |
| **H400*** | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| **H410** | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

***Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:***

| | |
|---|---|
| **P280** | Védőkesztyű használata kötelező. |
| **P308+P313** | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. |
| **P405** | Elzárva tartandó. |
| **P391** | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. |
| **P501** | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

***Kiegészítő veszélyességi információ:***

| | |
|---|---|
| **EUH401** | Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. |

***5.2. Különleges P-mondatok:***

| | |
|---|---|
| **SP 1** | A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a |

* Címkén nem feltüntetendő adat

gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

**SPe 3** A nem-cél szervezetek védelme érdekében a következő védősávok betartása szükséges:

| Kultúra/Ültetvény | Vízi védősáv a felszíni vizektől | Védősáv a nem mezőgazdasági területektől |
|---|---|---|
| őszi búza, sárgarépa, olajtök | **5 m** | - |
| kukorica, napraforgó, szója, burgonya, cirok | | **5 m** |
| szőlő, csonthéjasok, almatermésűek, díszfaiskola (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) | **10 m** (zárt gyep) | **5 m** |
| erdészet (tűlevelűek, lombos erdő) | | **10 m** (50%-os elsodr. csökk. szórófej egyidejű alkalmazásával 5 m) |

***5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások*:**

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

***5.4. Várakozási idők***

*5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap (száradásig)

*5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

| kultúra | várakozási idő *(nap)* |
|---|---|
| kukorica (szemes, siló), napraforgó, szója, olajtök, burgonya, cirok, őszi búza, szőlő (3 évesnél idősebb telepítés), erdészet (tűlevelűek, lombos erdő), díszfaiskola (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) 1 évesnél idősebb | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| sárgarépa | 28 |
| almatermésűek (3 évesnél idősebb telepítés) | 42 |
| csonthéjasok (3 évesnél idősebb telepítés) | 45 |

***5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:***

*5.5.1. Egyéni védőfelszerelés:*

*5.5.1.1. Előkészítőknek:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), FFP2 típusú részecskeszűrő félálarc

*5.5.1.2. Kijuttatóknak:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), FFP2 típusú részecskeszűrő félálarc

*5.5.2. Elsősegélynyújtás:*

*Mérgezéskor, allergiás megbetegedés* esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
*Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
*Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés.
*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

***6. Kiszerelés, csomagolás:***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:* | 80 g, 200 g, 400 g | 5 x 80 g, 5 x 200 g, 2 x 400 g, | 5 x 80 g | 400 g, 800 g, 1 kg, 10 x 400 g, 10 x 800 g, 10 x 1 kg, |
| *6.2. Csomagolószer anyaga:* | WSB PVAL | LDPE | alumínium | karton |

***7. Eltarthatósági idő:*** Fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

***8. Forgalmazási kategória:*** **I.**

Budapest, 2026. november 9.

**dr. Nemes Imre Zoltán**
elnök
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**
igazgató

*P.H.*